



العنایة بالطفل



ادعلوا هو أقرب للنقوي ،
اعدل يا أخي ويا أختي بين أبنائكم

اختي العزيزة رب أبنائك على حب تلاوة القرآن
وذكر الله فبذكر الله تطمئن القلوب

العناية بالطفل

* احتضان الطفل

■ عندما تختضن طفلك تأكدى دائما من أنك تستدين ظهره ورأمه جيدا بذراعيك الى أن يبلغ الشهر الثالث من عمره.

■ عدم الاكتشاف من حل الطفل لأن ذلك يعلمه على عدم الثقة بالنفس والاعتماد على أمه مستقبلا في كل شيء .

* بكاء الطفل :

■ بكاء الطفل رسالة يرسلها الطفل الى أمه بأنه يريد شيئا .

أسباب البكاء وطريقة علاجها :

١ - الجوع والعطش علاجهما إطعام الطفل

٢ - الوحدة علاجها الحمل

٣ - البول والبراز علاجها الباسه ثيابا حافة

٤ - الحر أو البرد علاجها إزالة بعض الأغطية أو وضعها

٥ - البراغيث والبعوض استعمال الناموسية والقضاء على البراغيث

٦ - الحاجة الى البكاء

٧ - المرض فعليك بمراجعة الطبيب وعلامات ذلك :

- عدم أخذ رضاعاته المعتادة

- ارتفاع الحرارة

- البكاء المستمر

- تدهور الحالة العامة للطفل .

ملاحظة : بكاء الطفل في أول شهر اذا لم يكن هناك سبب واضح للبكاء فيجب مراجعة الطبيب فقد يكون هناك التهاب عند الطفل .

* الارجاع أو التقيؤ:

■ الارجاع هو أن يلقط من فمه أثناء تناول الطعام أو بعده كمية من الطعام الذي ابتلعه وهذه ظاهرة طبيعية في فترة الطفولة الأولى ولا تدعوا إلى القلق .

■ غير أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة أو حتى منعها بالربرت على ظهر الطفل أثناء الرضاعة وبعدها ويحمل الطفل معتدلاً أو تحريركه برفق والتتأكد من أن الحليب معتدل الحرارة وينبغي ملاحظة أن يكون تركيز الحليب معتدلاً وكميته غير زائدة عن حاجة الطفل ، وأن الطفل لا يتلعله بسرعة طالما أن وزن الطفل طبيعي فليس في الارجاع ما يدعوا إلى القلق .

* تعریف التقيؤ:

■ أما التقيؤ فشيء آخر وهو عبارة عن تفريغ كامل وعنيف لكل ما تجويه المعدة و يحدث نتيجة لانفلونز جدران المعدة وهو كثير الحدوث في فترة الطفولة وهو كالارجاع يتبع عن أسباب مختلفة قد يكون بعضها سيعطى والبعض الآخر خطيراً لذلك نصحك براجعة الطبيب إذا تقيأ الطفل أكثر من مرتين في اليوم .

* براز الطفل الطبيعي :

■ عدد مراته: قد يكون بعد كل رضعة وقد يكون مرة واحدة في اليوم (يعتمد هذا على طبيعة الطفل) .

■ لونه: أصفر— قد يميل إلى الأصفر— إذا أعطى الطفل حليباً صناعياً.

■ قوامه: لينا— متماسك قليلاً .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مرروا أولادكم بالصلاحة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا بينهم في المصالح» *

رواه مسلم وغيره

* البراز غير الطبيعي:

في حالة الاسهال:

■ عدد مراته: أكثر من 7 مرات.

■ أحضر اللون قد يكون مختلطًا بالدم.

■ سائل (غير متماسك) يكون عادة في حالة النزلة المغوية و يصاحبها حالة جفاف للطفل ، حيث تجحب مراجعة الطبيب فورا .

في حالة الامساك:

■ أقل من مرة واحدة في اليوم

■ أصفر اللون

■ متماسك (صلب)

■ في حالة الامساك البسيط يمكن إعطاء الطفل سكر ذاتي في ماء مغلي بعد أن يبرد . إذا لم تتحسن الحالة فيجب مراجعة الطبيب فورا .

■ في حالة الرضاعة الطبيعية يقل عدد مرات التبرز عنها في حالة ارضاعه بالحليب الاصطناعي .

■ يكتسب الطفل عادة التبرز بعد (١٨) شهرا .

■ عدم مراعاة توعيد الطفل على عادة التبرز قد يؤدي إلى إمساك مزمن .

* تغرين الطفل على عادات التبرز والتبول:

يمكن تدريب الطفل على عادة التبرز والتبول باتباع الآتي :

■ نبدأ بها عندما يكون الطفل قادرًا على المشي .

■ نختار موعدًا مناسباً يكون فيه الطفل معتاداً على التبرز قبل وبعد الافطار .

■ في وقت يكون فيه سعيدا .

■ ضعي طفلك على الكرسي برفق .

■ بيّني له بالحركة والإشارة ما تريدينه أن يفعل .

■ إذا أبدى استياءه ارفعيه برفق من الكرسي ولا ترغمه .

■ انتظري أسبوع أو أكثر قبل أن تعاولي ذلك مرة أخرى .

■ هرائاتك الصبر متصلين في النهاية إلى ما تريدين .

يجب على الأم ملاحظة الآتي عند البدء في حالة التدريب:

- لا يكون الطفل في حالة إمساك.
- يوضع كرسي صغير ومرتفع مخصص للعقل في الحمام.
- قد يتخلل فترة التدريب عدم استجابة فهذا أمر طبيعي.
- تدريبات التحكم في البول تبدأ متأخرة عن تدريبات التحكم في التبرز وفي الذكور أبطأ من الإناث.

* الغيار:

يجب تغيير الفوطة باستمرار لمنع أي إصابات جلدية. ولرفع الفوطة ضعي الطفل فوق ملاءة أو منشفة، وبعد رفع الفوطة، أغسلي منطقة الأعضاء التناسلية بالماء الدافئ مستدانة من الأمام إلى الخلف ثم جففيها بالربرت عليها منشفة لينة. وإذا تبرز الطفل فلا ترفعي الفوطة إلا بعد أن تنشي أطرافها فوق موضع البراز، ثم امسحي العجزين بالقطن أو بورق المرحاض، وأغسلي الموضع كله بالماء والصابون وبعد الشطف جففي بالطريقة السابقة شرحها. وبعد ذلك ادهشني الموضع بالزيت أو محلول خاص مستعملة في ذلك قطعة من القطن مع الاهتمام بشباب الجلد والموضع الحساس منه، ثم ضعي طبقة خفيفة من المسحوق. وأنشاء قيامك بهذه العملية أمسكي بكعبين الطفل بين أصبعيك الإبهام والوسطى مع وضع الاصبع السبابية بين الكعبين ثم ارفعي النصف الأسفل من جسم الطفل لدرجة تكفي لوضع الفوطة التنفيفة بعد تهيئتها، على أن تكون الأجزاء السميكة من الفوطة إلى أعلى بين الفخذين وثبتيها بالدبوس.

